


Equipements de protection à revêtir dans le cadre des précautions standard (PS)

Soins infirmiers	Port de gants et type de gants			Autres équipements
	Gants vinyle non stériles 	Gants latex stériles 	Gants ménagers 	tablier à UU, masque, lunettes 
Pose sonde urinaire	non	oui		non
Ablation sonde urinaire	oui	non		non
Pose/retrait voie veineuse,	oui	non		non
injections : SC/IM/IV	oui	non		non
Prélèvements : sang, urines,	oui	non		non
Irrigation de plaie (mèche, drain...)	non	oui		non
Soins de plaie sans pinces : Plaies chroniques Plaie aseptique	oui non	non oui		Non, sauf si risque de projections, + masque et lunettes si besoin
Réfection pansement avec pinces	non	non		Non, sauf si risque de projections, + masque et lunettes si besoin
Soins orifice GPE (sonde de gastrostomie)	oui en routine non post op immédiat	non en routine oui post op immédiat		non
Soins de colostomie	oui en routine non post op immédiat	non en routine oui post op immédiat		non
Administration suppositoire...	oui	non		non
Lavement évacuateur	oui	non		oui tablier UU
Aspiration trachéale	oui	non		Tablier UU + masque de soins
Manipulation chambre implantable, Picc Line ou KTC	non	oui		non
Nettoyage et désinfection de dispositifs médicaux souillés immergeables	non	non	oui	non
Nettoyage des surfaces (chariots de soins, claviers DM non immergeables)	non	non	oui	non



Hygiène des mains, Port des gants & Equipements de protection

septembre 2018



1. L'Hygiène des mains : entre 2 patients, 2 activités, avant & après le retrait des gants.

La friction hydro-alcoolique des mains remplace le lavage des mains, dès lors que les mains sont ni souillées, ni mouillées. Il est possible de se laver les mains après trois ou quatre applications de produit hydro-alcoolique.

Technique de friction :



1. Le port de gants de soin est nécessaire :

- Lors des soins à risque de contact avec du sang et des liquides biologiques, la peau lésée du patient, les muqueuses.
- Lors de lésions des mains chez les professionnels.
- Lors des risques de piqûre et de coupure
- 1 paire de gants = 1 patient ou résident et un soin
- Retrait des gants dès la fin du soin, sur le lieu de soin.
→hygiène des mains immédiatement avant la pose et après le retrait.

→Port de « gants de ménage » indispensable pour le contact avec les produits chimiques.

2. Le port de tablier à usage unique est nécessaire :

- Pour les **soins souillants et/ou mouillants**

3. Le port de masque et de lunettes est nécessaire : en cas de risque de projection de liquides biologiques (ex : masque si soignant ou patient enrhumé)

Equipements de protection à revêtir dans le cadre des précautions standard (PS)

	Port de gants et type de gants		Autres équipements
Soins de base	Gants vinyle non stériles 	Gants ménagers 	Tablier UU 
Toilette peau saine	non	non	non
Toilette intime	oui	non	oui
Toilette à un patient incontinent	Oui, si patient souillé	non	oui
Soins de bouche, prothèse dentaire	oui	non	non
Changement protection anatomique	oui	non	oui
Application de crème thérapeutique	oui	non	non
Contact avec du linge propre	non	non	non
réfection de lit	non	non	non
Contact avec linge sale	oui si souillé/liquide biologique	non	Oui, si linge souillé
Alimentation entérale	non	non	chasuble
Vidage bassins et urinaux	oui	non	oui
Nettoyage et désinfection manuels des bassins et urinaux (hors lave bassins)	non	oui	oui
Manipulation et vidange poches et bœaux à urines	oui	non	oui
Manipulation matériel souillé (ex : plateau de soin)	non	oui	non
Transport des bassins et urinaux vers lave bassins	oui	non	non
Nettoyage des locaux et équipements sanitaires	non	oui	oui pour entretien WC
Evacuation des déchets	oui	non	oui
Entretien matériel hôtelier et office alimentaire	non	oui	oui